

შედგენილია გერმანიის, შვეიცარიის, ბელგიის, საბერძნეთის, პოლონეთის, რუსეთის, სლოვაკიის, ჩეხეთის, ლატვიის, ლიტვის, ესტონიის, უკრაინის, ბელარუსიის, ვიეტნამის, თურქეთისა და ბულგარეთის სამეცნიერო და საწესდებო წყაროების გამოყენებით.



ჰოსპისეპტი®
HOSPISEPT®

ბამოყენების მეთოდური მითითებები

1.ზოგადი დეზულება

1.1. **ჰოსპისეპტი®** – ანტისეპტიკური (სადეზინფექციო) საშუალებაა. პრეპარატის 100 გრ. შეიცავს: 55 გრ. 1-პროპანოლს, 15 გრ. დენატურირებულ ეთანოლს, დამატებით – 0,18 გრ. დიბუტილადიპატი, სტაბილიზატორი (0,13 გრ. პოლიოლის ცხიმმჟავის ეთერი), არომატიზატორი (0,06 გრ. “რაღლეი”).

1.2. **ჰოსპისეპტი®** წარმოადგენს გამჭვირვალე აქროლად სითხეს სპირტებისა და არომატიზატორის სასიამოვნო სუნით. პრეპარატი შეიცავს კანის დამცავ კომპონენტებს, რაც ხდის შესაძლებელს პრეპარატის ხშირ გამოყენებას.

1.3. პრეპარატი მოქმედებს ბაქტერიოციდულად, ტუბერკულოციდურად, ფუნგიციდურად, ინაქტივირებს ვირუსებს, მათ შორის შიდსის და ჰეპატიტ B, C ვირუსებს. 30 წამის განმავლობაში 100000-ჯერ ამცირებს ტრანზიტული მიკროფლორის რაოდენობას კანზე. მაღალეფექტურია კანის რეზიდენტური მიკროფლორის მიმართ, რაც უზრუნველყოფს ხარისხიან ანტისეპტიკას. კარგად ეთვისება კანს (ხშირი გამოყენების შემთხვევაშიც), საიმედოდ მოქმედებს შრატითა და სისხლით დაბინძურების შემთხვევაში. სპეციალური კომპონენტები იცავენ კანს გაშრობისგან, გაღიზიანებისგან და აადვილებენ ხელთათმანების ჩაცმას.

2. ბამოყენების არე.

ჰოსპისეპტი® გამოიყენება ხელებისა და კანის ჰიგიენური თუ ქირურგიული ხშირი ანტისეპტიკური დამუშავებისთვის. აგრეთვე კანის წინასაოპერაციო და წინასაინექციო ანტისეპტიკური დამუშავებისთვის.

ჰოსპისეპტი® იოლად დოზირებადი პრეპარატია კედლისა თუ ბოთლის დოზატორების მეშვეობით, რომლებიც განლაგებულია იმ ადგილებში, სადაც საჭიროა პერსონალის ანტისეპტიკური დამუშავება:

– პალატებში, შესახვევებში, საპროცედურო, საოპერაციო, სამშობიარო ბლოკებში, ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში, ლაბორატორიებში, ინფექციურ განყოფილებებში, სტომატოლოგიურ კაბინეტში, ამბულატორიებში

და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა დაწესებულებებში, მაღალი ინფექციური საშიშროების ზონებში;

– სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილებში და სხვა სანიტარულ ტრანსპორტში;

– საყოფაცხოვრებო პირობებში ავადმყოფების, ახალშობილების და ხანდაზმული ადამიანების მოვლისას;

– სამრეწველო სფეროში (კვების პროდუქტების გადამუშავება, კოსმეტიკური და ფარმაცევტული მრეწველობა);

– საზოგადოებრივი მომსახურების საწარმოებში (საპარკმახერო, სასტუმრო, აბანო, საუნა).

3. ჰოსპისეპტის ბამოყენება.

ჰოსპისეპტი განკუთვნილია გარეგანი გამოყენებისათვის განუზავებელი სახით.

3.1 ხელების ქირურგიული ანტისეპტიკა.

მედპერსონალის ხელების ქირურგიული ანტისეპტიკა მიმართულია შექმნილი პათოგენური (ტრანზიტული ფლორა) და კანზე მუდმივად არსებული მიკრობების (რეზიდენტული ფლორა) საწინააღმდეგოდ.



პრეპარატის გამოყენების წინ საჭიროა ხელების დაბანვა და ერთჯერადი ხელსაწმენდით გაშრობა. **"Lisoform Dr. Hans Rosemann GmbH"** -ის მიერ ხელების დასაბანად

რეკომენდებულია სპეციალური თხევადი საპონი **მაზა-სოფტ®** (5 მლ. საპონო ორჯერ; ძლიერი დაბინძურებისას – პირველი დაბანა – ჯავრისით).

ჰოსპისეპტი® -ს მინიმუმ 5 მლ. შეიზილება მშრალ ხელებში და წინამხრის მიდამოებში მიღებული წესით (განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს თითის წვერებს და ფრხილის ღარებს) პრეპარატის სრულ აორთქლებამდე (მაგრამ არანაკლებ 2,5 წუთის განმავლობაში). კანის ანტისეპტიკური დამუშავების პროცედურა ტარდება ორჯერ.

3.2. ხელების ჰიგიენური ანტისეპტიკა.

ჰიგიენური ანტისეპტიკა მიმართულია ტრანზიტული მიკროფლორის წინააღმდეგ. მანიპულაციის შესრულების და პაციენტის გამოკვლევის წინ აუცილებელია დასაბანი ხსნარით ხელის დაბანვა და გაშრობა.

მშრალ ხელებში შეიზილება 3 მლ. ჰოსპისეპტი მის სრულ აორთქლებამდე.

მანიპულაციების შესრულების შემდეგ, თუ

– კანი არ არის გაჭუჭყიანებული – ხელების დასველება პრეპარატის 3 მლ. და შეხელება 30 წამის განმავლობაში.

– კანი ჭუჭყიანია – საჭიროა ხელების გაწმენდა **ხოსპისეპტ ხელსაწმენდით®**, რის შემდეგ პრეპარატის 3 მლ. შეიზილება 30 წამის განმავლობაში.



ჰიგიენური ანტისეპტიკის შემდეგ ხელები უნდა დაიბანოს დასაბანი ხსნარით (რეკომენდებულია **მაზა-სოფტ®**-ით).

**ხელის დაბანის ტექნიკა
თვითოეული მოძრაობა უნდა განმეორდეს ხუთჯერ**

3.3. კანის ანტისეპტიკური დამუშავება.

კანის ანტისეპტიკური დამუშავება მდგომარეობს იმაში, რომ დამუშავებას დაქვემდებარებული ზედაპირი უნდა დასველდეს ჰოსპისეპტი და გაშრეს. ექსპოზიცია არა ნაკლებ 15 წამი, ხოლო კანის ის მიდამოები, სადაც დიდი რაოდენობითაა საოფლე ჯირკვლები – არანაკლებ 10 წუთი.

4. ბამოყენების თავისებურებები

4.1 არ გამოიყენება ღორწოვანი გარსის ანტისეპტიკისათვის, არ დაუშვით თვალებში პრეპარატის მოხვედრა. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღინიშნება არასასურველი რეაქციები პერსონალის კანის მხრიდან, შესაძლოა ჰოსპისეპტის მაგივრად გამოყენებულ იქნეს ანტისეპტიკი **აჰლ-2000** ზემოთ მოყვანილი წესით.



5. შეფუთვა, ტრანსპორტირება, შენახვის პირობები და ვადა.

5.1 შეფუთვა პოლიეთილენის ფლაკონი 150 მლ., 250 მლ. (დოზატორით), 500 მლ., 1000 მლ. მოცულობით.

5.2 ჰოსპისეპტი აალებადია, ამიტომ დაუშვებელია ღია ცეცხლთან შეხება. ინახება ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. ვარჯისიანობის ვადა 3 წელია. გათვალისწინებულია სახანძრო უსაფრთხოების ზომები. აალების შემთხვევაში ჩასაქრობათ გამოიყენება ქაფი, ქვიშა.

5.3 ჰოსპისეპტის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ქარხანა-დამამზადებლის ტარით (შეფუთვით) საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით, საშიში ტვირთის საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის წესების შესაბამისად სანძარსაწინააღმდეგო ზომების გათვალისწინებით.

მწარმოებელი - **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**. – გერმანია.

ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში



შ.პ.ს. "მედიკალ სერვისი" ტექნოლოგიები და სერვისი

საქართველო, თბილისი, ბელიაშვილის ქ. №83, ტელ/ფაქსი: 2-53-20-32; 2-53-20-36;

info@amts.ge



მოუსვათ ხელისგული ხელისგულს



მოუსვით მარჯვენა ხელისგული მარცხენას ზურგზე



მოუსვათ მარცხენა ხელისგული მარჯვენას ზურგზე



მოუსვათ თითების შიგნითა ზედაპირებზე ზემოთ-ქვემოთ მოძრაობით



მოუსვათ თითები ზურგის მხრიდან მეორე ხელისგულს



მოუსვათ თითებს წრიული მოძრაობებით



რიგრიგობით, წრიული მოძრაობებით მოუსვით ხელისგულებს

